

黑龙江省中医药管理局  
黑龙江省农业农村厅  
黑龙江省林业和草原局  
黑龙江省药品监督管理局

文件

签发人：张晓峰 王兆宪

黑中医药发〔2022〕5号

王东旭 李劲松


---

## 关于公布《黑龙江省道地药材目录》的通知

各市（地）人民政府（行署），省政府各相关单位：

按照《黑龙江省中医药条例》有关规定，经专家组评议通过黑龙江省道地药材目录，现予以公布。

(此页无正文)



---

黑龙江省中医药管理局

2022年4月2日印发

# 附件

## 黑龙江省道地药材目录

(第一批, 共 62 种) 说明: 种类药材名称按汉语拼音字母顺序统一排序。

序号	药材名称	基原	产区
1	白头翁	为毛茛科植物白头翁 <i>Pulsatile chinensis</i> (Bge.) Regel 的干燥根。	产于阿城、呼兰、五常、宾县、尚志、双城、宁安、海林、东宁、林口、穆棱、密山、虎林、饶河、勃利、宝清、集贤、桦南、富锦、木兰、延寿、依兰、通河、汤原、伊春、铁力、庆安、绥棱、望奎、绥化、安达、肇东、泰来、杜尔伯特蒙古族自治县、林甸、龙江、讷河、北安、萝北等地。
2	白薇	为萝藦科植物白薇 <i>Cynanchum atratum</i> Bge. 的干燥根及根茎。	产于泰来、安达、肇东、龙江、杜尔伯特蒙古族自治县、尚志、宁安、伊春、宝清、桦川、依兰、萝北、德都、北安等地。
3	白鲜皮	为芸香科植物白鲜 <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz. 的干燥根皮。	产于阿城、宾县、尚志、宁安、五常、海林、方正、延寿、东宁、林口、穆棱、密山、虎林、饶河、鸡西、桦南、勃利、集贤、富锦、木兰、宝清、佳木斯、依兰、通河、汤原、伊春、铁力、庆安、绥棱、绥化、海伦、北安、德都、孙吴、爱辉、嘉荫、萝北、讷河、嫩江、龙江以及大兴安岭地区
4	百合	为百合科植物卷丹 <i>Lilium lancifolium</i> Thunb.、细叶百合 <i>Lilium pumilum</i> DC. 的干燥肉质鳞茎。	<b>卷丹</b> 在我省广泛栽培, 药、食及观赏。 <b>细叶百合</b> 产于双城、肇东、肇源、肇州、安达、杜尔伯特蒙古族自治县、兰西、海伦、绥化、望奎、绥棱、明水、拜泉、克山、克东、北安、德都、富裕、讷河、甘南、林甸、龙江、泰来、呼玛、爱辉、逊克、嘉荫、伊春、萝北、铁力、庆安、汤原、通河、依兰、方正、延寿、宾县、巴彦、宝清、林口、虎林、饶河、穆棱、富锦、东宁、宁安、海林、尚志、五常、阿城等地。
5	板蓝根	为十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的干燥根。	于大庆市、齐齐哈尔市等地大量栽培。
6	暴马子皮	为木犀科植物暴马丁香 <i>Syringa reticulata</i> (Bl.) Hara var. <i>amurensis</i> (Rupr.) Pringle 的干燥干皮或枝皮。	产于黑龙江省东部山区及小兴安岭各地。
7	北豆根	为防己科植物蝙蝠葛 <i>Menispermum dauricum</i> DC. 的干燥根茎。	产于东南部山区、半山区及小兴安岭。
8	苍术	为菊科植物北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz. 的干燥根茎。	产于龙江、甘南、讷河、嫩江等地。
9	草苈蓉	为列当科植物草苈蓉 <i>Boschniakia rossica</i> (Cham. et Schlecht.)	产于大兴安岭、小兴安岭。寄生于桦木科赤杨属 ( <i>Alnus</i> ) 植物的根上。

		Fedtsch. 干燥全草。	
10	草乌	为毛茛科植物北乌头 <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb.的干燥块根。	产于五常、尚志、宁安、海林、东宁、林口、饶河、虎林、密山、通河、方正、勃利、依兰、桦南、汤原、伊春、庆安、铁力、嘉荫、呼玛、逊克、爱辉、孙吴、德都、北安、穆棱等地。
11	柴胡	为伞形科柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC.、狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.的干燥根。	<b>柴胡</b> 产于哈尔滨市、宁安县、虎林县、呼玛县、小兴安岭、完达山脉及东部山区、半山区。 <b>狭叶柴胡</b> 产于大小兴安岭、完达山脉、东部山区及哈尔滨、齐齐哈尔、黑河、绥化、大庆、齐齐哈尔等市县。
12	车前子	为车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L.、平车前 <i>Plantago depressa</i> Willd.的干燥成熟种子。	车前和平车前在我省各地普遍生长。
13	穿山龙	为薯蓣科植物穿龙薯蓣 <i>Dioscorea nipponica</i> Makino 的干燥根茎。	产于五常、尚志、阿城、宾县、宁安、延寿、方正、木兰、海林、东宁、林口、穆棱、依兰、通河、汤原、伊春、铁力、庆安等地。
14	赤芍	为毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根。	产于双城、阿城、宾县、五常、尚志、宁安、海林、牡丹江、东宁、密山、林口、穆棱、鸡西、鸡东、虎林、饶河、富锦、集贤、宝清、桦南、勃利、延寿、方正、巴彦、木兰、依兰、通河、汤原、伊春、铁力、庆安、绥棱、绥化、望奎、北安、克山、德都、讷河、孙吴、嫩江、龙江、泰来、甘南、富裕、爱辉、呼玛以及大兴安岭等地。
15	刺五加	为五加科植物刺五加 <i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr.etMaxim.) Harms 的干燥根和根茎或茎。	产于小兴安岭、老爷岭、张广才岭、完达山脉等山区。在牡丹江、伊春、鸡西、尚志等地大量栽培。
16	党参	为桔梗科植物党参 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.)Nannf.的干燥根。	产于五常、阿城、尚志、宁安、海林、木兰、通河、延寿、方正、依兰、穆棱、巴彦、铁力、汤原、伊春等东部山区。东北产党参习称“东党参”。
17	地肤子	为藜科植物地肤 <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.的干燥成熟果实。	适应力极强，各地普遍生长。
18	地榆	为蔷薇科植物地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L.、长叶地榆 <i>S. officinalis</i> L. var. <i>longifolia</i> (Bert.) Yü et Li 的干燥根。	地榆：布较广，东北各地普遍生长。 长叶地榆：广布于我省东部。
19	防风	为伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根。	我省广泛分布，主产于是杜尔伯特蒙古族自治县、肇州、安达、肇源、泰来、龙江、富裕、嫩江、林甸、甘南等地。

20	甘草	为豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎。	产于黑龙江省肇州、安达、杜尔伯特蒙古族自治县、泰来、肇源、林甸、龙江等县区。
21	关黄柏	为芸香科植物黄檗 <i>Phellodendron amurense</i> Rupr.的干燥树皮。剥取树皮，除去粗皮，晒干。	产于五常、阿城、尚志、宁安、海林、延寿、穆棱、方正、饶河、宝清、勃利、东宁、伊春、汤原、通河、萝北、逊克等地。
22	哈蟆油	为蛙科动物中国林蛙 <i>Rana temporaria chensinensis</i> David 或黑龙江林蛙 <i>Rana amurensis</i> Boulenger 雌蛙的干燥输卵管，经采制干燥而得。	中国林蛙产于哈尔滨、牡丹江、双鸭山、鹤岗、黑河、伊春、嘉荫、穆棱、东宁、逊克、孙吴、北安、阿城、尚志、海林、宾县、通河、抚远、甘南、佳木斯、林口、龙江、宁安、饶河、铁力、肇东等地。 黑龙江林蛙产于黑龙江各地，还见于吉林、辽宁、内蒙古。
23	槲寄生	为桑寄生科植物槲寄生 <i>Viscum coloratum</i> (Komar.) Nakai 的干燥带叶茎枝。	产于阿城、五常、宁安、尚志、宾县、木兰、牡丹江、勃利、东宁、林口、铁力、庆安、绥棱、通河、汤原、宝清、依兰、集贤、北安、德都、延寿、伊春、虎林、饶河等地。
24	黄精	为百合科植物黄精 <i>Polygonatum sibiricum</i> Red.的干燥根茎。	产于龙江、泰来、杜尔伯特蒙古族自治县、肇东、肇州等地。
25	黄芪	为豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao、膜荚黄芪 <i>A. membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根。	<b>膜荚黄芪</b> 产于大兴安岭、嫩江、讷河、甘南、穆棱、宁安、海林、尚志、五常、东宁、富锦、勃利、汤原、伊春、铁力、依兰、集贤、桦川、德都、北安、龙江、木兰、通河、绥棱、林口、鸡西等地。 <b>蒙古黄芪</b> 产于黑龙江省与内蒙古接壤的草原区，现广泛栽培。
26	黄芩	为唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根。	产于安达、肇东、肇州、林甸、明水、青冈、讷河、爱辉、富裕、杜尔伯特蒙古族自治县、甘南、萝北、逊克、汤原、东宁以及大兴安岭地区。
27	火麻仁	为桑科植物大麻 <i>Cannabis sativa</i> L.的干燥成熟种子	栽培，主产地为海伦、明水、拜泉、巴彦、宾县、青冈、望奎、呼兰、兰西等县。
28	桔梗	为桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A.DC.的干燥根。	全省各地均产，广泛栽培。
29	锦灯笼	为茄科植物酸浆 <i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino 的干燥宿萼或带果实的宿萼。	除西部草原外广泛生长，以东北山区最普遍。
30	金莲花	毛茛科,长瓣金莲花 <i>Trollius macropetalus</i> Fr. Schmidt、短瓣金莲花	产于东部至北部山区湿地。以北部大、小兴安岭资源最为丰富。

		<i>T. ledebouri</i> Reichb.的干燥花。	
31	苦参	为豆科植物苦参 <i>Sophora flavescens</i> Ait.的干燥根。	各地均产，以西部平原区资源丰富。
32	宽叶返魂草	为菊科植物麻叶千里光 <i>Senecio cannabifolius</i> Less.的带根全草。	产于大、小兴安岭，完达山，张广才岭，老爷岭等东部山区。
33	灵芝	为多孔菌科真菌赤芝 <i>Ganoderma lucidum</i> (Leyss.ex Fr.) Karst.、紫芝 <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang 的干燥子实体。	野生资源以紫芝为主，资源有限。现各地均有栽培，大多为选育的优质品种。
34	龙胆	为龙胆科植物条叶龙胆 <i>Gentiana manshurica</i> Kitag.、龙胆 <i>Gentiana scabra</i> Bge.的干燥根和根茎。	<b>条叶龙胆</b> 产于安达、肇东、肇州、青冈、兰西、明水、依安、齐齐哈尔、杜尔伯特蒙古族自治县、泰来、林甸、甘南、富裕、双城、巴彦等地。 <b>龙胆</b> 产于黑龙江省北安、德都、讷河、富裕、阿城、五常、双城、尚志、海林、宁安、勃利、富锦、依兰、铁力、汤原、伊春、饶河、密山、虎林、逊克、呼玛、爱辉、漠河等地。
35	鹿茸	为鹿科动物梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> Temminck、马鹿 <i>C. elaphus</i> Linnaeus 的雄鹿未骨化密生茸毛的幼角。	<b>梅花鹿</b> 主产于吉林、辽宁等地，我省东部山区较多养殖。 <b>马鹿</b> 主要生长区在黑龙江、吉林。我省东部山区有养殖。
36	鹿药	为百合科植物鹿药 <i>Smilacina japonica</i> A.Gray 的干燥根状茎和根。	产于大兴安岭、小兴安岭、老爷岭、张广才岭、完达山脉疏林下或林间草地、林缘。
37	满山红	为杜鹃花科植物兴安杜鹃 <i>Rhododendron dauricum</i> L.的干燥叶。	产于完达山区、张广才岭、老爷岭、小兴安岭、大兴安岭等山区。
38	绵马贯众	为鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨 <i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai 的干燥根茎和叶柄残基。	产于阿城、五常、尚志、海林、宁安、东宁、穆棱、林口、虎林、饶河、方正、勃利、桦南、延寿、通河、木兰、汤原、依兰、伊春、铁力、庆安、绥棱等县（市）山区林下，野生资源丰富。
39	木贼	为木贼科植物木贼 <i>Equisetum hyemale</i> L.的干燥地上部分。	产于东部山区，产于尚志、五常、海林、宁安、阿城、勃利、桦南、汤原、依兰、巴彦、延寿、铁力、伊春、通河等县（市）山区林下，野生资源丰富。
40	南沙参	为桔梗科植物轮叶沙参 <i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunb.)Fisch.的干燥根。	产于西部平原和东部山区，野生资源丰富。
41	牛蒡子	为菊科植物牛蒡 <i>Arctium lappa</i> L.的干燥成熟果实。	产于五常、尚志、宁安、海林、庆安、宾县、宝清、巴彦、延寿、阿城、木兰、青冈、鸡西、密山、穆棱、富锦、勃利、望奎、通河、依兰、东宁、绥化、绥棱、海伦、龙江等县。
42	平贝母	为百合科植物平贝母 <i>Fritillaria ussuriensis</i> Maxim.的干燥鳞茎。	产于五常、尚志、阿城、宾县、延寿、宝清、木兰、依兰、通河、宁安、东宁、穆棱、密山、饶河、虎林、集贤、方正、桦川、林口、伊春、汤原、铁力、庆安、德都等地。
43	蒲公英	为菊科植物蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.、碱地蒲公英 <i>Taraxacum borealisinense</i> Kitam.或	<b>蒲公英</b> 产于黑龙江各地草地上，西部平原区资源丰富。 <b>碱地蒲公英</b> 产于松嫩平原盐碱草地、草甸上，齐齐哈尔、富裕、依安、安达、林甸、杜尔伯特自治县、大庆、肇东、肇源、肇州等地，资源丰富。

		同属数种植物的干燥全草。	
44	芡实	为睡莲科植物芡 <i>Euryale ferox</i> Salisb. 的干燥成熟种仁。	产于泰来、肇源、肇东、肇州、哈尔滨、兰西、宾县、杜尔伯特蒙古族自治县、望奎、呼兰、双城、阿城、延寿、木兰、五常等地。
45	青龙衣	为胡桃科植物胡桃楸 <i>Juglans mandshurica</i> Maxim. 未成熟果实的外果皮。	产于东部及东南山区，产于阿城、宾县、五常、尚志、宁安、海林、东宁、穆棱、密山、虎林、饶河、桦川、林口、勃利、依兰、通河、方正、延寿、木兰、巴彦、宝清、富锦、汤原、伊春、铁力、庆安、绥棱等地。
46	人参	为五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎。	产于五常、尚志、海林、林口、宁安、东宁、依兰、方正、延寿、通河、虎林、饶河、穆棱、汤原、铁力、伊春等东部山区及小兴安岭南坡。
47	沙棘	为胡颓子科植物沙棘 <i>Hippophae rhamnoides</i> L. 的干燥成熟果实。	各地广泛引种栽培。兼有防风固沙、药用、浆果等多方面价值。
48	射干	为鸢尾科植物射干 <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC. 的干燥根茎。	各地广泛引种栽培。
49	升麻	为毛茛科植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>C. dahurica</i> (Turcz.) Maxim. 的干燥根茎。	<b>大三叶升麻</b> 产于黑龙江省东部及北部，野生资源丰富。 <b>兴安升麻</b> 产于黑龙江省阿城、五常、尚志、宁安、海林、穆棱、铁力、庆安、伊春、爱辉等东部山区及大、小兴安岭地区。
50	水飞蓟	为菊科植物水飞蓟 <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. 的干燥成熟果实。	引入栽培，绥化、北安、呼玛等地大量栽培。
51	水蛭	为水蛭科动物蚂蟥 <i>Whitmania pigra</i> Whitman、水蛭 <i>Hirudo nipponica</i> Whitman、柳叶蚂蟥 <i>Whitmania acranulata</i> Whitman 的干燥全体。	产于各地水体及稻田渠中。
52	菟丝子	为旋花科植物菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam. 的干燥成熟种子。	产于我省各地。
53	威灵仙	为毛茛科植物棉团铁线莲 <i>Clematis hexapetala</i> Pall.、东北铁线莲 <i>Clematis manshurica</i> Rupr. 的干燥根和根茎。	<b>棉团铁线莲</b> 产于我省西部及东部草地、山坡。 <b>东北铁线莲</b> 产于我省东部山区及半山区。
54	五味子	为木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实。	产于黑龙江省阿城、宾县、五常、尚志、海林、宁安、东宁、穆棱、林口、鸡西、密山、虎林、饶河、桦南、富锦、勃利、宝清、集贤、友谊、木兰、延寿、方正、巴彦、依兰、通河、汤原、伊春、铁力、庆安、绥棱、北安、德都、嫩江、克东、孙吴、爱辉、呼玛等地。
55	西洋参	为五加科植物西洋参 <i>Panax quinquefolium</i> L. 的干燥根。	东部山区多有栽培。
56	益母草	为唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt. 的新鲜或干燥地上部分。	处于我省各地普。

57	玉竹	为百合科植物玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce 的干燥根茎。	产于肇东、杜尔伯特、阿城、宾县、五常、尚志、海林、宁安、东宁、穆棱、鸡西、林口、虎林、饶河、桦川、勃利、宝清、富锦、佳木斯、依兰、鹤岗、通河、木兰、方正、延寿、汤原、伊春、绥棱、铁力、萝北、嘉荫、北安、克东、德都、孙吴、爱辉、呼玛及大兴安岭地区。
58	远志	为远志科植物远志 <i>Polygala tenuifolia</i> Willd.、卵叶远志 <i>P. sibirica</i> L.的干燥根。	<b>远志</b> 产于杜尔伯特蒙古族自治县、肇州、肇源、双城、呼兰、泰来、龙江、富裕、宾县、阿城、五常、依兰、富锦、集贤、宁安、东宁、林甸、宝清、萝北、爱辉等地。 <b>卵叶远志</b> 产于东部及北部山区及半山区。
59	月见草	为柳叶菜科植物月见草 <i>Oenothera biennis</i> L.种子的脂肪油。	引进栽培，各地广泛栽培。
60	知母	为百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.的干燥根茎。	产于肇东、肇州、肇源、安达、杜尔伯特蒙古族自治县、龙江、富裕、讷河、绥化、青冈、兰西、阿城、双城、宁安等地。
61	紫苏	为唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.。	干燥成熟果实入药为“紫苏子”；干燥叶（或带嫩枝）入药为“紫苏叶”；秋季果实成熟后的干燥茎入药为“紫苏梗”。除大兴安岭外各地均栽培。
62	紫杉	为红豆杉科植物东北红豆杉 <i>Taxus cuspidate</i> Sieb.EtZucc.的干燥枝和叶。	产于我省张广才岭及老爷岭山区、小兴安岭南部（绥棱）。

注：

1.《中国药典》未收录“青龙衣”；《中华本草》收录“胡桃青皮”，【别名】青胡桃皮（《救急方》），青龙衣（《山东中草药手册》），【来源】为胡桃科植物胡桃的未成熟果实的外果皮。【生境分布】主产河北、山东、山西。此外，陕西、东北等地亦产。即胡桃楸 *Juglans mandshurica* Maxim.。